

Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008

Art	Bestand 1995/97	Bestand 2005/06	Häufigkeitsklasse	Trend	RL 2008
Amsel	250.000-300.000	270.000-320.000	h	(=)	
Auerhuhn	max. 1	0	ex	(-)	0
Austernfischer	7-11	12-15	ss	(+)	
Bachstelze	30.000-45.000	25.000-40.000	h	(=)	
Bartmeise	500-700*	800-1.200	mh	(+)	
Baumfalke	ca. 300	300-400	s	(-)	2
Baumpieper	80.000-120.000	40.000-60.000	h	(-)	V
Bekassine	650-950	900-1.500	mh	(-)	2
Beutelmeise	400-600*	450-700	s	(+)	
Bienenfresser	0-1	0-1	es	(+)	
Birkenzeisig					
Birkhuhn	<5 Ind.	max. 3-6 Ind.	es	(-)	1
Blaukehlchen	90-130	180-230	s	(-)	3
Blaumeise	200.000-450.000	200.000-450.000	h	(=)	
Blauracke			ex		0
Blessralle	7.000-12.000	10.000-15.000	h	(=)	
Bluthänfling	30.000-50.000*	10.000-20.000	mh	(-)	3
Brachpieper	300-400*	400-550	s	(-)	2
Brandgans	30-40	60-70	ss	(+)	
Braunkehlchen	10.000-15.000	6.000-10.000	mh	(-)	2
Brautente	0	0-1			
Buchfink	300.000-400.000	300.000-500.000	h	(=)	
Buntspecht	55.000-120.000	60.000-130.000	h	(=)	
Dohle	700-900	450-500	s	(-)	1
Doppelschnepfe			ex		0
Dorngrasmücke	40.000-80.000	40.000-75.000	h	(-)	
Drosselrohrsänger	2.100-2.400	4.500-7.000	mh	(-)	V
Eichelhäher	30.000-40.000	45.000-60.000	h	(-)	
Eisvogel	400-1.000*	700-1.300	s/mh	(=)	3
Elster	15.000-25.000	25.000-40.000	h	(=)	
Erlenzeisig	50-100*	100-400	s	(=)	3
Fasan	4.000-6.000	4.500-7.000	mh	(=)	
Feldlerche	400.000-600.000	300.000-400.000	h	(-)	3
Feldschwirl	8.000-15.000*	4.000-7.000	m	(=)	
Feldsperling	100.000-200.000	50.000-100.000	h	(-)	V
Fichtenkreuzschnabel	0-10*	20-150	ss	(+)	
Fischadler	170-200	294-297	s	(+)	
Fitis	200.000-300.000	150.000-220.000	h	(=)	
Flussregenpfeifer	300-500*	450-650	s	(-)	1
Flusseeschwalbe	250-300	610-625	s	(-)	3
Flussuferläufer	15-20	30-40	ss	(-)	2
Gänsesäger	40-55	70-90	ss	(-)	2
Gartenbaumläufer	20.000-30.000	20.000-30.000	h	(=)	
Gartengrasmücke	80.000-120.000	65.000-100.000	h	(=)	
Gartenrotschwanz	10.000-20.000*	7.000-13.000	mh/h	(-)	V
Gebirgsstelze	230*	600-800	s	(+)	V
Gelbspötter	40.000-80.000	30.000-55.000	h	(-)	V
Gimpel	1.000-3.000	1.000-2.000	mh	(=)	
Girlitz	3.600-5.000*	5.000-9.000	mh	(=)	V
Goldammer	70.000-150.000	70.000-130.000	h	(=)	
Gr. Brachvogel	140-150	83-86	s	(-)	1
Graugammer	2.000-3.500*	8.000-15.000	mh/h	(-)	
Graugans	1.800-2.000	3.000-5.000	mh	(+)	
Graureiher	ca. 3.150	2.500-3.500	mh	(=)	
Grauschnäpper	20.000-30.000	20.000-30.000	h	(-)	
Grauspecht	5-20	20-30	ss	(=)	3
Großtrappe	80-117 Ind.	101-104 Ind.	ss	(-)	1
Grünfink	150.000-200.000	70.000-130.000	h	(=)	
Grünspecht	2.000-3.000	3.000-4.400	mh	(=)	

Art	Bestand 1995/97	Bestand 2005/06	Häufigkeitsklasse	Trend	RL 2008
Habicht	ca. 1.200	1.000-1.500	s/mh	(=)	V
Haselhuhn	? (Wiedereinbürgerungsversuch seit 1994)		es	?	0
Haubenlerche	2.500-3.000	1.300-1.700	mh	(-)	2
Haubenmeise	25.000-45.000	35.000-60.000	h	(=)	
Haubentaucher	2.500-3.500*	3.500-5.000	mh	(-)	V
Hausrotschwanz	35.000-55.000	25.000-40.000	h	(+)	
Hausperling	500.000-800.000	550.000-850.000	h	(-)	
Heckenbraunelle	15.000-30.000	12.000-23.000	h	(=)	
Heidelerche	12.000-18.000*	12.000-20.000	h	(-)	
Höckerschwan	800-1.200	1.400-1.700	mh	(+)	
Hohltaube	2.000-3.000	3.000-4.500	mh	(-)	
Kampfläufer	0-5	0-1	es	(-)	1
Kanadagans	3-4	>7			
Karmingimpel	50-120	35-50	ss	(+)	3
Kernbeißer	20.000-30.000	20.000-30.000	h	(-)	
Kiebitz	2.100-2.300*	1.300-1.700	mh	(-)	2
Klappergrasmücke	50.000-80.000	45.000-70.000	h	(=)	
Kleiber	23.000-34.000	40.000-80.000	h	(=)	
Kleinralle	30-55	50-70	ss	(-)	2
Kleinspecht	1.500-2.000*	2.500-4.000	mh	(=)	
Knäkente	50-150	150-220	s	(-)	3
Kohlmeise	250.000-600.000	300.000-600.000	h	(=)	
Kolbenente	2	41974	ss	(+)	
Kolkrabe	1.000-1.500	2.500-3.500	mh	(+)	
Kormoran	1.200-1.650	2.300-2.700	mh	(+)	
Kornweihe	0	0	ex	(-)	0
Kranich	>825	1.700-1.900	mh	(+)	
Krickente	50-150	180-250	s	(-)	1
Kuckuck	8.000-15.000	4.500-8.000	mh	(=)	
Lachmöwe	4.000-10.000	7.000-10.000	mh/h	(-)	V
Löffelente	100-200	100-150	s	(-)	2
Mandarinente	20-30	110-130			
Mauersegler	10.000-15.000	10.000-15.000	h	(+)	
Mäusebussard	6.500-7.500	5.000-7.000	mh	(=)	
Mehlschwalbe	100.000-200.000	50.000-100.000	h	(=)	
Misteldrossel	8.000-10.000	4.000-7.000	mh	(=)	
Mittelmeermöwe	1-14	1-14	es	(+)	R
Mittelspecht	1.700-1.900*	2.500-3.200	mh	(=)	
Mönchsgrasmücke	100.000-110.000	150.000-170.000	h	(=)	
Moorente	0	0-1	es	(-)	1
Mornellregenpfeifer	früher ausnahmsweise Brutvogel				
Nachtigall	23.000-28.000	15.000-25.000	h	(+)	
Nachtreiher			ex		0
Nebelkrähe	20.000-30.000	20.000-30.000	h	(=)	
Neuntöter	ca. 30.000	12.000-20.000	h	(-)	V
Nilgans	0	39936			
Ortolan	2.400	3.700-5.200	mh	(-)	V
Pfeifente			ex		0
Pirol	8.000-12.000	6.000-10.000	mh/h	(-)	V
Purpureiher	ausnahmsweise Brutvogel				
Rabenkrähe	50-200	50-200	ss/s	(=)	
Raubwürger	200-300	550-750	s	(=)	
Rauchschwalbe	150.000-300.000*	50.000-100.000	h	(-)	3
Raufußkauz	20-30	80-100	s	(+)	
Rebhuhn	1.000-2.000*	1.000-1.500	mh	(-)	2
Reiherente	ca. 500	400-650	s	(+)	
Ringeltaube	80.000-120.000	90.000-130.000	h	(=)	
Rohrhammer	40.000-60.000	35.000-55.000	h	(=)	
Rohrdommel	60-100	200-250	s	(-)	3
Rohrschwirl	1.200-1.500*	2.200-3.500	mh	(+)	

Art	Bestand 1995/97	Bestand 2005/06	Häufigkeitsklasse	Trend	RL 2008
Rohrweihe	1.200-1.400	1.100-1.500	mh	(-)	3
Rostgans	ausnahmsweise Brutvogel (Gefangenschaftsflüchtling)				
Rotdrossel			ex		0
Rotfußfalke	ausnahmsweise Brutvogel				
Rothalstaucher	200-300	180-250	s	(-)	1
Rotkehlchen	200.000-300.000	200.000-300.000	h	(=)	
Rotkopfwürger			ex	(-)	0
Rotmilan	1.100-1.300	1.200-1.500	mh	(-)	3
Rotschenkel	65-95	59-63	SS	(-)	1
Saatkrähe	1.400-1.700	1.100	mh	(-)	2
Säbelschnabler	0-2	0-1	es	(+)	R
Sandregenpfeifer	0-2	0	es	(-)	1
Schafstelze	6.000-10.000*	8.000-15.000	mh/h	(=)	V
Schellente	450-650	1.200-1.600	mh	(+)	
Schilfrohrsänger	1.900-2.100	3.000-4.500	mh	(-)	V
Schlagschwirl	300-500*	600-1.000	s	(+)	V
Schlangenadler			ex		0
Schleiereule	800-900	650-900	s/mh	(=)	3
Schnatterente	200-250*	500-700	s	(=)	
Schreiadler	27-30	21-23	ss	(-)	1
Schwanzmeise	20.000-30.000*	8.000-12.000	h	(=)	
Schwarzhalstaucher	105-270	135-155	s	(-)	1
Schwarzkehlchen	100-130	600-800	s	(+)	
Schwarzkopfmöwe	0	6-8	es	(+)	R
Schwarzmilan	550-650	800-1.100	mh	(-)	
Schwarzspecht	3.400-3.800	3.400-4.600	mh	(=)	
Schwarzstirnwürger			ex	(-)	0
Schwarzstorch	44-50	48-51	ss	(=)	3
Seeadler	75-85	125-136	s	(+)	
Seggenrohrsänger	25-35	5-12	es	(-)	1
Silbermöwe	90-115	185-210	s	(+)	
Singdrossel	60.000-100.000	60.000-100.000	h	(=)	
Singschwan	3	5-8	es	(+)	R
Sommergoldhähnchen	800-1.500*	3.000-5.000	mh	(=)	
Sperber	700-1.000	900-1.400	mh	(-)	V
Sperbergrasmücke	3.000-4.000	1.800-3.000	mh	(-)	3
Sperlingskauz	>4-9	20-35	ss	(+)	V
Spießente	0-5	1	es	(-)	1
Sprosser	1.500-2.000	1.200-1.600	mh	(=)	
Star	200.000-300.000	150.000-250.000	h	(=)	
Steinadler			ex		0
Steinkauz	7-12	42705	ss	(-)	2
Steinschmätzer	400-700*	700-900	s/mh	(-)	1
Stelzenläufer	0	0-1	es		
Steppenmöwe	1-5	1-5	es	(+)	R
Stieglitz	40.000-50.000	25.000-30.000	mh/h	(+)	
Stockente	20.000-40.000*	15.000-30.000	h	(=)	
Straßentaube	10.000-20.000	10.000-20.000	h	(+)	
Sturmmöwe	18-25	36	SS	(+)	
Sumpfmöwe	8.000-16.000	12.000-23.000	h	(=)	
Sumpfohreule	0-2	1-6	es	(-)	1
Sumpfrohrsänger	30.000-60.000	25.000-50.000	h	(=)	
Tafelente	1 000-2.000	500-750	s	(-)	1
Tannenhäher	ausnahmsweise Brutvogel				
Tannenmeise	50.000-90.000	60.000-100.000	h	(=)	
Teichralle	900-1.300*	1.800-2.800	mh	(-)	

Art	Bestand 1995/97	Bestand 2005/06	Häufigkeitsklasse	Trend	RL 2008
Teichrohrsänger	20.000-35.000	20.000-35.000	h	(+)	
Trauerschnäpper	9.000-12.000*	8.000-16.000	mh/h	(=)	
Trauerseeschwalbe	300-400	370-435	s	(-)	2
Triel			ex		0
Tüpfelralle	100-150	100-150	s	(-)	1
Türkentaube	6.000-8.000"	5.500-7.500	mh	(+)	
Turmfalke	1.100-1.400*	1.600-2.200	mh	(-)	V
Turteltaube	4.500-7.000	1.800-3.000	mh	(-)	2
Uferschnepfe	65-80	15-18	ss	(-)	1
Uferschwalbe	15.000-20.000	5.000-7.000	mh	(-)	2
Uhu	5-10	<10	es	(+)	1
Wacholderdrossel	200-250*	800-1.500	mh	(=)	
Wachtel	300-1.000*	3.000-5.000	mh	(+)	
Wachtelkönig	260-320	250-400	s	(-)	1
Waldbaumläufer	20.000-30.000	20.000-30.000	h	(=)	
Waldkauz	3.000-4.000	2.500-4.000	mh	(=)	
Waldlaubsänger	40.000-60.000*	15.000-35.000	h	(=)	
Waldohreule	3.000-4.500	2.500-4.000	mh	(=)	
Waldschnepfe	1.000-2.000	1.400-2.400	mh	(=)	
Waldwasserläufer	200-250	300-400	s	(=)	
Wanderfalke	>3	>14	ss	(-)	2
Wasseramsel	ausnahmsweise Brutvogel				
Wasserralle	1.800-2.500	2.000-3.000	mh	(=)	
Weidenmeise	15.000-30.000*	6.000-12.000	mh/h	(=)	
Weißbartseeschwalbe	0-4	0-20	es	(+)	R
Weißflügelseeschwalbe	0-23	0-54	es	(+)	R
Weißrückenspecht			ex		0
Weißstorch	1.130-1.350	1.180-1.220	mh	(-)	3
Wendehals	1.500-2.000*	1.200-1.800	mh	(-)	2
Wespenbussard	ca. 700	350-450	s	(-)	2
Wiedehopf	160-200	220-270	s	(-)	3
Wiesenpieper	2.200-2.600*	2.000-4.000	mh	(-)	2
Wiesenweihe	0-5	50-70	ss	(-)	2
Wintergoldhähnchen	5.000-10.000	5.000-10.000	mh/h	(=)	
Zaunkönig	70.000-100.000	80.000-120.000	h	(=)	
Ziegenmelker	1.000-1.200	1.700-2.100	mh	(-)	3
Zilpzalp	140.000-230.000	130.000-220.000	h	(=)	
Zwergdommel	10-16	45-60	ss	(-)	2
Zwergmöwe	ausnahmsweise Brutvogel				
Zwergschnäpper	500-1.000	400-800	s	(=)	3
Zwergschnepfe			ex		
Zwergseeschwalbe	0-5	0-2	es	(-)	1
Zwergtaucher	500-1.000*	1.200-1.800	mh	(-)	V
Zwergtrappe	früher ausnahmsweise Brutvogel				

Abkürzungen:

Häufigkeitsklasse	ex	ausgestorben
	es	extrem selten
	ss	sehr selten
	s	selten
	mh	mittelhäufig
Trend	h	häufig
	(-)	langfristiger Rückgang
	(=)	langfristig stabil
	(+)	langfristige Zunahme
RL 2008	0	Erloschen oder verschollen
	1	Vom Aussterben bedroht
	2	Stark gefährdet
	3	Gefährdet
	R	Extrem selten, Arten mit geografischer Restriktion
	V	Vorwarnliste